

Exercice 1

On considère les vecteurs suivants de \mathbb{R}^4 :

$$X = (1, -2, 0, 3), \quad Y = (-1, 2, 1, -1), \quad Z = (1, 3, -2, 0).$$

- 1) Calculer les combinaisons linéaires suivantes:
 $2 \cdot X - Y + Z, \quad 2 \cdot (X + Y) + Z, \quad X - Y + 3 \cdot Z$
- 2) Déterminer les scalaires réels λ_1, λ_2 et λ_3 , de façon que le vecteur $\lambda_1 X + \lambda_2 Y + \lambda_3 Z$, ait ses deux dernières composantes nulles.

Exercice 2

Soit, dans l'espace vectoriel \mathbb{R}^3 , l'ensemble F_1 des triplets de la forme $(a - b, a, 2a + b)$ où a et b sont des réels quelconques, et l'ensemble F_2 des triplets de la forme (x, y, z) tels que $x = y = z$.

- 1) Démontrer que F_1 et F_2 sont des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^3 , et indiquer une base pour chacun d'eux.
- 2) Déterminer $F_1 + F_2$.

Exercice 3

- 1) Montrer que l'ensemble G des triplets de la forme $(a + \beta, a, a + 2\beta)$, a et β étant des réels quelconques, est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^3 . Trouver une base de G .
- 2) Même questions avec l'ensemble $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y - z = 0\}$
- 3) Même questions avec l'ensemble $I = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y - z = 0 \wedge y = 2x\}$.

Exercice 4

Dans \mathbb{R}^3 muni de la base canonique $\mathfrak{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$, considérons les vecteurs :

$$v_1 = 2 \cdot e_1 + e_2 + e_3, \quad v_2 = e_2 - e_3, \quad v_3 = -e_2 + e_3$$

- 1) Calculer $v_1 + v_2 + v_3$. Que représente le vecteur $v_2 + v_3$ pour le vecteur v_1 ?
- 2) Donner une base du sous-espace engendré par les vecteurs v_1, v_2 et v_3 .
- 3) Déterminer x, y et z pour que les trois vecteurs $v_4 = (x, y, z), v_1$ et v_2 soient linéairement dépendants.

Exercice 5

Considérons les vecteurs lignes de \mathbb{R}^3 :

$$A = (-1, 2, 5), \quad B = (2, 3, 4), \quad C = (7, 0, -7).$$

Montrer que A, B et C sont linéairement dépendants.

Exercice 6

Dans \mathbb{R}^3 muni de la base canonique $\mathfrak{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$,
 considérons les vecteurs: $v_1 = e_1 - e_2 + e_3$ et $v_2 = -e_1 - e_2 - e_3$.

- 1) Donner une base du sous-espace $F = \langle v_1, v_2 \rangle$.
- 2) Démontrer que le vecteur $A = 2 \cdot e_2$ appartient au sous-espace F .
 Dans la base canonique B on considère le sous-espace vectoriel
 $G = \{X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$.
- 3) Donner une Base de $F + G$.
 Trouver dans cette base les composantes de $A = e_2 - e_3$.

Exercice 7

Dans \mathbb{R}^3 muni de la base canonique $\mathfrak{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$,
 considérons les vecteurs: $v_1 = 2e_1 - e_2 + e_3$, $v_2 = -e_1 + e_2 + e_3$

- 1) Donner une base du sous-espace $F = \langle v_1, v_2 \rangle$
- 2) Démontrer que $E = \langle -e_1 - 2e_2 + e_3 \rangle$ est un sous-espace
 supplémentaire de F dans \mathbb{R}^3
- 3) Par rapport à la base canonique \mathfrak{B} les vecteurs $X(x, y, z)$ d'un
 sous-espace vectoriel G satisfont à la condition: $2x - 3y + z = 0$
 Déterminer la dimension et une de base de G .

Exercice 8

Déterminer la dimensions du sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^5
 engendrés par les vecteurs :

$$u = (1, -1, 0, 2, 1), \quad v = (2, 1, 1, 3, -1), \quad w = (0, 1, 1, 2, 1), \quad t = (4, -2, 0, 5, 0).$$

Exercice 9

Déterminer le rang des systèmes de vecteurs suivants :

- a) $u = (1, -1, 2), \quad v = (1, 1, 0), \quad w = (0, 1, -1), \quad t = (1, -4, 5)$.
- b) $u = (0, 1, -1, 2), \quad v = (3, 0, 1, 1), \quad w = (-1, -1, 0, 0), \quad t = (1, -4, 5)$

Exercice 10

Déterminer une base et la dimension des s.e.v de \mathbb{R}^3 engendrés
 par les familles de vecteurs $\{X_i\}$:

- a) $X_1 = (1, 0, 1), \quad X_2 = (-1, -1, 0), \quad X_3 = (-1, 1, 1)$.
- b) $X_1 = (0, 1, -2), \quad X_2 = (-1, 1, -3), \quad X_3 = (-2, 3, -8)$.