I. GLYCOLYSE

I.1. GENERALITES

C'est la voie de Embden-Meyerhoff (=voie des trioses P) : principale voie d'utilisation des glucides, commune à l'ensemble des cellules de l'organisme .

- Permet la production d'énergie (sous forme d' ATP), et de précurseurs de molécules d'intérêt biologique (glycérol 3 P).
- Se déroule dans le cytosol.
- Peut se faire en condition aérobie (mitochondrie) et anaérobie.

1^{ère} phase : 1 mol de glc (6C) $\square$ 2 mol de pyruvate (3C) + 2

ATP **2^{ème} phase** :

- Anaérobie : pyruvate $\square$ lactate
- Aérobie : pyruvate entre dans cycle de Krebs

Remarque :

- Universalité de la glycolyse : mode de production énergétique le plus ancien et commun à toutes les espèces
- **TOUS LES INTERMEDIAIRES SONT PHOSPHORILES** (charges -)
 - $\square$ Evite qu'ils sortent de la cellule
 - $\square$ Reconnaissance enzyme-substrat
 - $\square$ Degré d'énergie supérieur

On différencie les étapes en fonction du nombre de C des éléments :

1^{ère} partie : 6C : glucose activé par phosphorylation $\square$ fructose 6 biphosphate (-2ATP)

2^{ème} partie : 3C : formation des trioses P $\square$ pyruvate (+ 2 ATP/pyruvate = 4 ATP/glc)

3 réactions irréversibles

NB : déshydrogénation = oxydation

I.2. LES REACTIONS

Du glucose au glucose-6-phosphate :

Réaction exothermique et **irréversible**.

□ Hexokinase :

- Présente dans les **tissus extra-hépatiques**
- Très **grande affinité pour le glucose** (K_m faible = activité max à de faibles concentration de glucose plasmatique $[Glc]_{sg}$)
- Rôle = répondre au besoin énergétique des cellules
- Phosphoryle aussi le Galactose et Fructose (**non spécifique du glucose**)
- Enzyme allostérique inhibée par le glucose-6-phosphate, nécessite du Mg^{2+}

□ Glucokinase (c'est un type d'hexokinase):

- Présente dans le **foie et le pancréas**
- **Affinité plus faible pour le glucose** (K_m élevé = activité optimale en période postprandial pour $[Glc]_{sg} > 5\text{mmol/L}$)
- Rôle : élimine le glucose de la circulation sanguine en période postprandiale
- Activité inductible (insuline)
- But : faire du stockage

□ Glucose-6-phosphate : nombreuses interrelations métaboliques :

- Néoglucogenèse
- Voie Pentose-Phosphate
- Glycogénolyse
- Glycogénogenèse

Du glucose-6-phosphate au fructose-6-phosphate :

- Isomérisation aldose en cétose
- Réaction réversible

Du fructose-6-P au fructose-1,6-bisphosphate :

- Etape limitante +++ de la glycolyse (la plus lente)**
- ATP donneur de phosphate
- Réaction irréversible** et fortement exothermique
- Etape d'engagement de la glycolyse

- PFK-1** : enzyme allostérique (enzyme clé de la glycolyse)
 - o Régulation :
 - Activée par l' AMP et le fructose 6 P
 - Inhibée par l' ATP et le citrate (élément du début du cycle de Krebs)
 - Régulation hépatique :
 - Activée par le fructose 2, 6 bisphosphate

A partir de là, il s'agit des réactions à 3 atomes de carbone :

Clivage du fructose-1,6-bisphosphate :

- Réaction de clivage réversible
- Seul le glycéraldéhyde-3-P poursuit la glycolyse
- Isomérase permet l'interconversion (réversible) des 2 trioses
- Réaction déplacée dans le sens glycéraldéhyde-3-P, consommé dans la réaction suivante

Du glycéraldéhyde 3 phosphate au 1,3 bisphosphoglycérate

- Réaction d'oxydation : **consommation d'un N D+** qui va être ré-oxydé (et d'un Pi) : **forme le NADH,H+**
- 1,3 bisphosphoglycérate : 1^{er} composé riche en énergie
- Utilisation de NADH, H+ en aérobiose

Du 1,3 bisphosphoglycérate au 3 phosphoglycérate

- Transfert d'un groupement phosphate sur l' DP, et formation de la première molécule d' TP
- Phosphorylation liée au substrat

Du 3 phosphoglycérate au 2 phosphoglycérate

- réaction d'isomérisation

Du 2 phosphoglycérate au phosphoénolpyruvate

- Réaction de déshydratation
- Phosphoénolpyruvate : riche en énergie

Du phosphoénolpyruvate au pyruvate :

- Réaction **irréversible**
- Formation d'une molécule d' ATP**
- Phosphorylation liée au substrat

I.3. BILAN REACTIONNEL ET ENERGETIQUE

- Réaction générale de la première phase de la glycolyse :

- Production de 2 molécules d' ATP par molécule de glucose (2 consommées et 4 produites)**
- Formation de 2 NADH, H⁺ qui devront être ré-oxydées

I.4. REGULATION

- 3 réactions clés (= irréversibles) 4 enzymes clés :

- **Hexokinase :**
 - Inhibition par le Glucose-6-P
- **Glucokinase (hépatique) :**
 - Activation par l'insuline (activation transcriptionnelle)
- **PFK-1 :**
 - Inhibition par l' ATP, citrate
 - Activation par l' ADP, fructose-6-P, fructose-2,6-bisP (foie)
- **Pyruvate kinase :**
 - Inhibition par l' ATP, Citrate
 - Activation par l' ADP, l' augmentation de [glucose], fructose-1,6-bisP
 - Régulation hépatique : - glucagon, + insuline

I.5. DESTINEES DU PYRUVATE

5.1. En conditions anaérobies

5.1.1. Fermentation lactique (chez l'homme : activité musculaire intense provoquant un déficit en O₂ et donc l'activation de ce système, chez la bactérie : yaourt)

- LDH fonctionne avec NADH, H⁺
- Réaction réversible
- Accumulation de lactate : crampes musculaires douloureuses
- **Dans le globule rouge, voie obligatoire (car pas de mitochondries)**
- Permet la régénération du NAD⁺ (Glyceraldéhyde-3-P déshydrogénase) par l'utilisation du NADH, H⁺
- **Coopération muscle-foie = recyclage du lactate musculaire**

Remarque : le muscle cardiaque, bien que fonctionnant strictement en aérobose (nombreuses mitochondries, vascularisation) utilise à l'effort le lactate produit par les squelettiques

5.1.2. Fermentation alcoolique :

- Pas chez l'homme !
- Certains micro-organisme (levure) : fabrication des boissons alcoolisées (CO₂ + éthanol)

5.2. En condition aérobie

- **En présence d'O₂ : entrée du pyruvate dans la mitochondrie** : substrat du cycle de Krebs. Transport actif, couplé au passage d'un H⁺ : O₂ passe dans la matrice mitochondriale grâce à un symport

- Remarque : ré-oxydation du NADH, H⁺ produit au cours de la glycolyse dans la chaîne respiratoire mitochondriale avec production concomitante d' TP

□ Entrée du NADH, H⁺ dans la mitochondrie : navette du malate

- Réaction générale : Pyruvate + NAD⁺ + CoA ® Acetyl-CoA + NADH, H⁺ + CO₂

- L'enzyme impliquée est le complexe de la **pyruvate déshydrogénase (PDH)** :

- Dans la matrice mitochondriale
- Complexe multienzymatique (> 90 su) : 3 réactions enzymatiques successives et plusieurs co-enzymes
- Action séquentielle sur le substrat, les intermédiaires réactionnels restent associés aux

enzymes : décarboxylation □ transacétylation □ déshydrogénation

II. VOIES DES PENTOSE PHOSPHATE

II.1. GENERALITES

Il s'agit d'une voie de dérivation des hexoses monoP (autre destiné du glc, mineur $\approx 10\%$). Très liée à la glycolyse (shunt).

- A lieu dans toutes les cellules
- Dans le cytosol
- Son fonctionnement est plus important dans le foie, les glandes mammaires, la cortico-surrénale

Elle **ne produit pas d' TP**, mais a 2 fonctions importantes :

- Production de NADPH, H⁺ (synthèse AGs et stéroïdes) donc de pouvoir réducteur

Synthèse du ribose (biosynthèse des AN)

- Permet le maintien de la concentration en glutathion réduit

Elle ne nécessite pas d'O₂ (donc on ne parle jamais d'aérobiose et d'anaérobiose)

Elle comprend **2 phases réactionnelles** :

- **1^{ère} : oxydative irréversible**
 - Glc-6-P $\rightarrow$ ribulose-5-P
 - Production de NADPH, H⁺
- **2^{ème} : réversible non oxydative**
 - Production de fructose-6-P et de glycéraldéhyde-3-P
 - Transcétolase et transaldolase
 - Couplage à la voie de la glycolyse

Vue d'ensemble :
Ponts avec la glycolyse

II.2. Etapes réactionnelles

1^{ère} étape : **phase oxydative irréversible**

Glc-6-P → acide-6-phosphogluconique

G6PD : enzyme limitante de la voie des pentoses P

- Etape oxydative : déhydrogénation + ouverture du cycle
- Production de NADPH,H+ (synthèse stéroïdes, des AGs, et régénération du glutathion réduit)

NB : un déficit en G6PD diminue les capacités cellulaires à lutter contre le stress oxydant (favorise les anémies hémolytiques et ictère)

- Acide-6-phosphogluconique → ribulose-5-P
- Déshydrogénation sur le C3 puis décarboxylation
- Production de NADPH,H+
- Irréversible

2^{ème} étape : phase **non oxydative réversible** :

- Puis : Intervention de 2 enzymes : (réaction réversibles)
- 1 **transcétolase** : transfert 2C

- 1 **transaldolase** : transfère 3C
- Puis 1 transcétoleuse encore

II.3. BILAN ET FONCTIONNEMENT

3 modes de fonctionnement importants dans cette voie

- Si besoins majeurs en ribose-5P : pour synthèse des nucléotides (ARN, ADN, coE nucléotidiques...)
- Si besoins majeurs en NADPH,H⁺
 - Protection contre stress oxydant
 - Elimination de substances non hydrosolubles par hydroxylation
 - Biosynthèses (cholestérol et AG : foie, AG : TA et glandes mammaires, stéroïdes : cortico surrénale, stéroïde : ovaires et testicules)
 - Autre source de NADPH,H⁺ : enzyme malique
- Si besoin fort en ATP et besoin en NADPH,H⁺ faible : dans le muscle

Cette voie n'est pas là pour produire de l'énergie mais pour répondre à d'autres besoins cellulaires